

化学療法指示書 (ポート・末梢)

R-CHOP (1日目)(悪性リンパ腫)

週1回1週投与、2週休み(6~8コース)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ロキソプロフェンNa 1錠 30分前
★ ポララミン錠2mg 2錠 30分前

① リツキシマブ(375mg/m²) _____ mg
生食 _____ mL mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
(10倍になるよう希釈 表参照)

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 _____ mL
リツキシマブ _____ mL
500mg/50mL V
100mg/10mL V
生食500mL V
生食 _____ mL V mL

<点滴速度>

[初回]

経過時間	点滴速度
0~60分	20mL/h
60~120分	50mL/h
120~180分	100mL/h
180分~	200mL/h

[2回目~]

経過時間	点滴速度
0~60分	100mL/h
60分~	200mL/h

<希釈液量>

リツキシマブ [®] (mg)	生食(mL)	リツキシマブ [®] (mg)	生食(mL)	リツキシマブ [®] (mg)	生食(mL)
450	405	550	495	650	585
460	414	560	504	660	594
470	423	570	513	670	603
480	432	580	522	680	612
490	441	590	531	690	621
500	450	600	540	700	630
510	459	610	549	710	639
520	468	620	558	720	648
530	477	630	567	730	657
540	486	640	576	740	666

化学療法指示書 (ポート・末梢)

R-CHOP(2日目)(悪性リンパ腫)

週1回1週投与、2週休み(6~8コース)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ☆ プレドニン100mg 経口 5日間

ケモセーフロック輸液セット使用

備考欄

1本目にハックスパイク
つける

① プロイメンド1V+生食100mL (30分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

① 総量 100 mL

② アロキシ点滴静注バッグ1袋 (15分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② 総量 50 mL

③ ドキソルビシン(50mg/m²) _____ mg (30分)
生食100mL _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ 総量 _____ mL
50mg/V V 5mL→ mL
10mg/V V 2mL→ mL
素早く溶かす

③ 終了時
オンコビン(1.4mg/m²) _____ mg (最大量2mg)
生食20mL (管注1分) フィルター一通さない _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ 終了時 総量 _____ mL
1mg/V V 10mL→ mL

④ 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑤ エンドキサン(750mg/m²) _____ mg
生食500mL (120分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑤ 総量 _____ mL
500mg/V V 25mL→ mL

→終了時 生食シリンジ10mL _____ 時 分 ⑩ ⑩

翌日のジーラスタ 初回は無し

2回目以降 有 無