

化学療法指示書 (ポート・末梢)

アバスチン+CAPOX(大腸癌)

注射をカペシタビン1日目に投与(カペシタビン 2週投与、1週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ☆ カペシタビン _____ mg 分2 14日分 1日目夕から内服
(2000mg/m²/day)

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A _____ } (15分)
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ アバスチン(7.5mg/kg) _____ mg
生食100mL 初回90分 mL/h _____
2回目以降60分 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

④ 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑤ オキサリプラチン(130mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖500mL (120分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL ポート末梢 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
⑤の流速と同じ

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
アバスチン _____ mL
400mg/16mL V
100mg/4mL V

⑤ 総量 _____ mL
オキサリプラチン _____ mL
100mg/20mL V
50mg/10mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

CAPOX(大腸癌・胃癌)

注射をカペシタビン1日目に投与(カペシタビン 2週投与、1週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ☆ カペシタビン _____ mg 分2 14日分 1日目夕から内服
(2000mg/m²/day)

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A _____ } (15分)
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ オキサリプラチン(130mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖500mL (120分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL ポート 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
末梢 ③の流速と同じ

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
オキサリプラチン mL
100mg/20mL V
50mg/10mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

CPT-11(胃癌・大腸癌)

週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
 月 _____ 日 ()

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ イリノテカン(150mg/m²) _____ mg 【遮光】
 生食500mL (90分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL

300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
 イリノテカン _____ mL
 100mg/5mL _____ V
 40mg/2mL _____ V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

de Gramont(大腸癌)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	印 印
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋 アロキシ点滴静注バッグ1袋 } (15分)	mL/h	時 分	印 印
③ レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	印 印
④ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	印 印
④側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h	mL/h	時 分	印 印
<2日目> 月 日 ()			
⑤ レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	印 印
⑥ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	印 印
⑥側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h	mL/h	時 分	印 印
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	印 印

備考欄	
① 総量	100 mL
③ 総量	50 mL
③ 総量	mL
100mg/V V 10mL→	mL
25mg/V V 5mL→	mL
④ 総量	mL
フルオロウラシル	mL
1000mg/20mL	V
250mg/5mL	V
④側管より 総量	mL
フルオロウラシル	mL
1000mg/20mL	V
250mg/5mL	V
⑤ 総量	mL
100mg/V V 10mL→	mL
25mg/V V 5mL→	mL
⑥ 総量	mL
フルオロウラシル	mL
1000mg/20mL	V
250mg/5mL	V
⑥側管より 総量	mL
フルオロウラシル	mL
1000mg/20mL	V
250mg/5mL	V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

アバスチン+de Gramont(大腸癌)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名		
身長	cm	体重	kg	
体表面積	m ²			
<1日目> 月 日 ()				
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	備考欄 ① 総量 100 mL
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋 アロキシ点滴静注バッグ1袋 } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	③ 総量 50 mL
③ アバスチン(5mg/kg or 10mg/kg) _____ mg 生食100mL 初回90分 2回目以降60分	mL/h	時 分	⑩ ⑩	③ 総量 アバスチン 400mg/16mL 100mg/4mL mL mL V V
④ 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩	
⑤ レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	⑤ 総量 100mg/V V 10mL→ mL 25mg/V V 5mL→ mL
⑥ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	⑥ 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL 250mg/5mL mL mL V V
⑥側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩	⑥側管より 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL 250mg/5mL mL mL V V
<2日目> 月 日 ()				
⑦ レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	⑦ 総量 100mg/V V 10mL→ mL 25mg/V V 5mL→ mL
⑧ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	⑧ 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL 250mg/5mL mL mL V V
⑧側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩	⑧側管より 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL 250mg/5mL mL mL V V
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩	

化学療法指示書 (ポート・末梢)

ベクティビックス+de Gramont(大腸癌)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
内服 ★ ポララミン錠(2) 2錠 直前			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	印 印
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	印 印
③ ベクティビックス(6mg/kg) _____mg 生食100mL (60分)	mL/h	時 分	印 印
④ 生食100mL (単独で60分、経過観察)		時 分	印 印
⑤ レボホリナート(100mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	印 印
⑥ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	印 印
⑥側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	印 印
<2日目> 月 日 ()			
⑦ レボホリナート(100mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	印 印
⑧ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	印 印
⑧側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	印 印
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	印 印

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量		mL
ベクティビックス		mL
400mg/20mL		V
100mg/5mL		V
⑤ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
⑥ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑥側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑦ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
⑧ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑧側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V

化学療法指示書

FOLFIRI-1(大腸癌)(フューザーポンプ)
週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④ フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤ フルオロウラシル(2400mg/m ²) _____ mg 生食 _____ mL (46時間) ※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食シリンジ10mL		時 分	⑩ ⑩

備考欄

① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
③側管より 総量		mL
イリノテカン		mL
100mg/5mL		V
40mg/2mL		V
④ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑤ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
生食	mL	瓶

化学療法指示書

FOLFIRI-1(大腸癌)(ポート)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	印 印
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	印 印
③ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	印 印
③側管より 【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h	時 分	印 印
④ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h	時 分	印 印
④側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h	mL/h	時 分	印 印
<2日目> 月 日 ()			
⑤ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h	時 分	印 印
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	印 印

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
③側管より 総量		mL
イリノテカン		mL
100mg/5mL		V
40mg/2mL		V
④ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
④側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑤ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V

化学療法指示書

FOLFIRI-1(大腸癌)(末梢)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より 【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h	mL/h	時 分	⑩ ⑩
<2日目> 月 日 ()			
⑤ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩

備考欄

① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
③側管より 総量		mL
イリノテカン		mL
100mg/5mL		V
40mg/2mL		V
④ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
④側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑤ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V

化学療法指示書

2枠

アバスチン+FOLFIRI-1(大腸癌)(フューザーポンプ)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ アバスチン(5mg/kg or 10mg/kg) _____ mg 生食100mL 初回90分 2回目以降60分	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④ 生食50mL	300 mL/h		
⑤ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤側管より【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥ フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑦ フルオロウラシル(2400mg/m ²) _____ mg 生食 _____ mL (46時間) ※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食シリンジ10mL		時 分	⑩ ⑩

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量 アバスチン		mL
400mg/16mL		V
100mg/4mL		V
⑤ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
⑤側管より 総量 イリノテカン		mL
100mg/5mL		V
40mg/2mL		V
⑥ 総量 フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑦ 総量 フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
生食	mL	瓶

化学療法指示書

アバスチン+FOLFIRI-1(大腸癌)(ポート)
週1回1週投与、1週休み

		患者名		診断名				
		身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²	
<1日目>		月	日	()				
①	プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時	分	印	印	備考欄 ① 総量 100 mL	
②	{ グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時	分	印	印	② 総量 51 mL	
③	アバスチン(5mg/kg or 10mg/kg) _____ mg 生食100mL 初回90分 2回目以降60分	mL/h	時	分	印	印	③ 総量 アバスチン 400mg/16mL V 100mg/4mL V	
④	生食50mL	300	mL/h					
⑤	レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時	分	印	印	⑤ 総量 100mg/V V 10mL→ mL 25mg/V V 5mL→ mL	
⑤	側管より【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h	時	分	印	印	⑤側管より 総量 イリノテカン 100mg/5mL V 40mg/2mL V	
⑥	フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h	時	分	印	印	⑥ 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL V 250mg/5mL V	
⑥	側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	300	mL/h	時	分	印	印	⑥側管より 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
<2日目>		月	日	()				
⑦	フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h	時	分	印	印	⑦ 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL V 250mg/5mL V	
→終了時		生食50mL	300	mL/h	時	分	印	印

化学療法指示書

アバスチン+FOLFIRI-1(大腸癌)(末梢)
週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ アバスチン(5mg/kg or 10mg/kg) _____ mg 生食100mL 初回90分 2回目以降60分	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④ 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤側管より 【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩
<2日目> 月 日 ()			
⑦ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩

備考欄

① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量 アバスチン		mL
400mg/16mL		V
100mg/4mL		V
⑤ 総量		mL
100mg/V V 10mL→		mL
25mg/V V 5mL→		mL
⑤側管より 総量 イリノテカン		mL
100mg/5mL		V
40mg/2mL		V
⑥ 総量 フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑥側管より 総量 フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑦ 総量 フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V

化学療法指示書

2枠

サイラムザ+FOLFIRI-1(大腸癌)(フューザーポンプ)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ 生食50mL	300 mL/h		
④ サイラムザ(8mg/kg) _____ mg 生食250mL (60分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤ 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥側管より【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑦ フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑧ フルオロウラシル(2400mg/m ²) _____ mg 生食 _____ mL (46時間) ※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食シリンジ10mL		時 分	⑩ ⑩

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
④ 総量 サイラムザ		mL
500mg/50mL		V
100mg/10mL		V
⑥ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
⑥側管より 総量 イリノテカン		mL
100mg/5mL		V
40mg/2mL		V
⑦ 総量 フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑧ 総量 フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
生食	mL	瓶

化学療法指示書

サイラムザ+FOLFIRI-1(大腸癌)(ポート)
週1回1週投与、1週休み

		患者名		診断名				
		身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²	
<1日目>		月	日	()				
内服		★ポララミン(2)		2錠	直前			
①	プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	① 総量 100 mL	
②	{ グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	② 総量 51 mL	
③	生食50mL	300	mL/h					
④	サイラムザ(8mg/kg) _____mg 生食250mL (60分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	④ 総量 サイラムザ mL 500mg/50mL V 100mg/10mL V	
⑤	生食50mL	300	mL/h					
⑥	レボホリナート(200mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	⑥ 総量 mL 100mg/V V 10mL→ mL 25mg/V V 5mL→ mL	
⑥	側管より 【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____mg 生食250mL (90分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	⑥側管より 総量 mL イリノテカン mL 100mg/5mL V 40mg/2mL V	
⑦	フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h	時	分	⑩	⑩	⑦ 総量 mL フルオロウラシル mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V	
⑦	側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖50mL	300	mL/h	時	分	⑩	⑦側管より 総量 mL フルオロウラシル mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V	
<2日目>		月	日	()				
⑧	フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h	時	分	⑩	⑩	⑧ 総量 mL フルオロウラシル mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V	
→終了時		生食50mL	300	mL/h	時	分	⑩	⑩

化学療法指示書

2枠

サイラムザ+FOLFIRI-1(大腸癌)(末梢)
週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
内服 ★ポララミン(2) 2錠 直前			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ 生食50mL	300 mL/h		
④ サイラムザ(8mg/kg) _____mg 生食250mL (60分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤ 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥ レボホリナート(200mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥側管より 【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____mg 生食250mL (90分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑦ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____mg ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑦側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩
<2日目> 月 日 ()			
⑧ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____mg ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩

備考欄

① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
④ 総量		mL
サイラムザ		mL
500mg/50mL		V
100mg/10mL		V
⑥ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
⑥側管より 総量		mL
イリノテカン		mL
100mg/5mL		V
40mg/2mL		V
⑦ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑦側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑧ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V

化学療法指示書

2枠

ザルトラップ+FOLFIRI-1(大腸癌)(フューザーポンプ)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	印 印
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	印 印
③ ザルトラップ(4mg/kg) 生食100mL (60分)	mg mL/h	時 分	印 印
④ 生食50mL	300 mL/h		
⑤ レボホリナート(200mg/m ²) 5%ブドウ糖250mL (120分)	mg mL/h	時 分	印 印
⑤側管より【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) 生食250mL (90分)	mg mL/h	時 分	印 印
⑥ フルオロウラシル(400mg/m ²) 5%ブドウ糖50mL	mg 300 mL/h	時 分	印 印
⑦ フルオロウラシル(2400mg/m ²) 生食 _____ mL (46時間) ※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて	mg mL/h	時 分	印 印
→終了時 生食シリンジ10mL		時 分	印 印

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
ザルトラップ _____ mL
200mg/8mL V
100mg/4mL V
21G使用

⑤ 総量 _____ mL
100mg/V V 10mL→ mL
25mg/V V 5mL→ mL

⑤側管より 総量 _____ mL
イリノテカン _____ mL
100mg/5mL V
40mg/2mL V

⑥ 総量 _____ mL
フルオロウラシル _____ mL
1000mg/20mL V
250mg/5mL V

⑦ 総量 _____ mL
フルオロウラシル _____ mL
1000mg/20mL V
250mg/5mL V
生食 _____ mL 瓶

化学療法指示書

ザルトラップ+FOLFIRI-1(大腸癌)(ポート)
週1回1週投与、1週休み

		患者名		診断名			
		身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
<1日目>		月	日	()			
①	プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時	分	印	印	備考欄 ① 総量 100 mL
②	{ グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時	分	印	印	② 総量 51 mL
③	ザルトラップ(4mg/kg) _____ mg 生食100mL (60分)	mL/h	時	分	印	印	③ 総量 _____ mL ザルトラップ _____ mL 200mg/8mL V 100mg/4mL V <u>21G使用</u>
④	生食50mL	300 mL/h					
⑤	レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時	分	印	印	⑤ 総量 _____ mL 100mg/V V 10mL→ mL 25mg/V V 5mL→ mL
⑤	側管より 【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h	時	分	印	印	⑤側管より 総量 _____ mL イリノテカン _____ mL 100mg/5mL V 40mg/2mL V
⑥	フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h	時	分	印	印	⑥ 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
⑥	側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時	分	印	印	⑥側管より 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
<2日目>		月	日	()			
⑦	フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h	時	分	印	印	⑦ 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
→終了時		生食50mL	300 mL/h	時	分	印	印

化学療法指示書

ザルトラップ[®]+FOLFIRI-1(大腸癌)(末梢)
週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	印 印
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	印 印
③ ザルトラップ(4mg/kg) 生食100mL (60分)	mg mL/h	時 分	印 印
④ 生食50mL	300 mL/h	時 分	印 印
⑤ レボホリナート(200mg/m ²) 5%ブドウ糖250mL (120分)	mg mL/h	時 分	印 印
⑤側管より【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) 生食250mL (90分)	mg mL/h	時 分	印 印
⑥ フルオロウラシル(1200mg/m ²) ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mg mL/h	時 分	印 印
⑥側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) 5%ブドウ糖50mL	mg 300 mL/h	時 分	印 印
<2日目> 月 日 ()			
⑦ フルオロウラシル(1200mg/m ²) ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mg mL/h	時 分	印 印
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	印 印

備考欄

① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量		mL
ザルトラップ		mL
200mg/8mL		V
100mg/4mL		V
		<u>21G使用</u>
⑤ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
⑤側管より 総量		mL
イリノテカン		mL
100mg/5mL		V
40mg/2mL		V
⑥ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑥側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑦ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V

化学療法指示書

2枠

ベクティビックス+FOLFIRI-1(大腸癌)(フューザーポンプ)

週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ ベクティビックス(6mg/kg) _____ mg
生食100mL (60分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

④ 生食100mL (単独で60分、経過観察) _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑤ レボホリナート(200mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖250mL (120分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑤側管より【遮光】
イリノテカン(150mg/m²) _____ mg
生食250mL (90分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑥ フルオロウラシル(400mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑦ フルオロウラシル(2400mg/m²) _____ mg
生食 _____ mL (46時間) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて

→終了時 生食シリンジ10mL _____ 時 分 ⑩ ⑩

備考欄			
① 総量	100	mL	
② 総量	51	mL	
③ 総量		mL	
ベクティビックス		mL	
400mg/20mL		V	
100mg/5mL		V	
⑤ 総量		mL	
100mg/V	V 10mL→	mL	
25mg/V	V 5mL→	mL	
⑤側管より 総量		mL	
イリノテカン		mL	
100mg/5mL		V	
40mg/2mL		V	
⑥ 総量		mL	
フルオロウラシル		mL	
1000mg/20mL		V	
250mg/5mL		V	
⑦ 総量		mL	
フルオロウラシル		mL	
1000mg/20mL		V	
250mg/5mL		V	
生食	mL	瓶	

化学療法指示書

ベクティビックス+FOLFIRI-1(大腸癌)(ポート)
週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h 時 分 印 印

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h 時 分 印 印

③ ベクティビックス(6mg/kg) _____ mg
生食100mL (60分) mL/h 時 分 印 印

④ 生食100mL (単独で60分、経過観察) 時 分 印 印

⑤ レボホリナート(200mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖250mL (120分) mL/h 時 分 印 印

⑤側管より 【遮光】
イリノテカン(150mg/m²) _____ mg
生食250mL (90分) mL/h 時 分 印 印

⑥ フルオロウラシル(1200mg/m²) _____ mg
ソルデム3A1000mL (23時間) mL/h 時 分 印 印

⑥側管より
フルオロウラシル(400mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖50mL 300 mL/h 時 分 印 印

<2日目> 月 日 ()

⑦ フルオロウラシル(1200mg/m²) _____ mg
ソルデム3A1000mL (23時間) mL/h 時 分 印 印

→終了時 生食50mL 300 mL/h 時 分 印 印

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 mL
ベクティビックス mL
400mg/20mL V
100mg/5mL V

⑤ 総量 mL
100mg/V V 10mL→ mL
25mg/V V 5mL→ mL

⑤側管より 総量 mL
イリノテカン mL
100mg/5mL V
40mg/2mL V

⑥ 総量 mL
フルオロウラシル mL
1000mg/20mL V
250mg/5mL V

⑥側管より 総量 mL
フルオロウラシル mL
1000mg/20mL V
250mg/5mL V

⑦ 総量 mL
フルオロウラシル mL
1000mg/20mL V
250mg/5mL V

化学療法指示書

ベクティビックス+FOLFIRI-1(大腸癌)(末梢)
週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	備考欄
プロイメンド1V+生食100mL (30分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	{ グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	ベクティビックス(6mg/kg) _____ mg 生食100mL (60分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	生食100mL (単独で60分、経過観察) _____ 時 分 ⑩ ⑩	レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	⑤側管より 【遮光】 イリノテカン(150mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	⑤側管より 総量 _____ mL イリノテカン _____ mL 100mg/5mL _____ V 40mg/2mL _____ V
					⑥側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	⑥側管より 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL _____ V 250mg/5mL _____ V	
						⑦ 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL _____ V 250mg/5mL _____ V	
→終了時 生食50mL							

<2日目> 月 _____ 日 ()

化学療法指示書 (ポート・末梢)

アバスチン+FOLFOX4(大腸癌)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ アバスチン (5mg/kg or 10mg/kg) _____ mg 生食100mL 初回90分 2回目以降60分	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④ 生食50mL 300 mL/h		時 分	⑩ ⑩
⑤ レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤側管より オキサリプラチン(85mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖500mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL ポート 300 mL/h 末梢 ⑤側管の流速と同じ	mL/h	時 分	⑩ ⑩
<2日目> 月 日 ()			
⑦ レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑧ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑧側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食50mL 300 mL/h		時 分	⑩ ⑩

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量 アバスチン		mL
400mg/16mL		V
100mg/4mL		V
⑤ 総量		mL
100mg/V V 10mL→		mL
25mg/V V 5mL→		mL
⑤側管より 総量		mL
オキサリプラチン		mL
100mg/20mL		V
50mg/10mL		V
⑥ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑥側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑦ 総量		mL
100mg/V V 10mL→		mL
25mg/V V 5mL→		mL
⑧ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑧側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

ベクティビックス+FOLFOX4(大腸癌)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ ベクティビックス(6mg/kg) _____mg 生食100mL (60分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④ 生食100mL (単独で60分、経過観察)		時 分	⑩ ⑩
⑤ レボホリナート(100mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤側管より オキサリプラチン(85mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖500mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖50mL ポート 300 mL/h 末梢 ⑤側管の流速と同じ	mL/h	時 分	⑩ ⑩
<2日目> 月 日 ()			
⑦ レボホリナート(100mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑧ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑧側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖50mL	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量		mL
ベクティビックス		mL
400mg/20mL		V
100mg/5mL		V
⑤ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
⑤側管より 総量		mL
オキサリプラチン		mL
100mg/20mL		V
50mg/10mL		V
⑥ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑥側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑦ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
⑧ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑧側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
2018.6 最成病院化学療法		

化学療法指示書 (ポート・末梢)

FOLFOX4(大腸癌・胃癌)

週1回1週投与、1週休み

		患者名		診断名			
		身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
<1日目>		月	日	()			
①	プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	備考欄 ① 総量 100 mL
②	{ グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	② 総量 51 mL
③	レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	③ 総量 _____ mL 100mg/V V 10mL→ _____ mL 25mg/V V 5mL→ _____ mL
③	側管より オキサリプラチン(85mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖500mL (120分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	③側管より 総量 _____ mL オキサリプラチン _____ mL 100mg/20mL V 50mg/10mL V
④	フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時	分	⑩	⑩	④ 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
④	側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL ポート 300 mL/h 末梢 ③側管の流速と同じ	mL/h	時	分	⑩	⑩	④側管より 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
<2日目>		月	日	()			
⑤	レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時	分	⑩	⑩	⑤ 総量 _____ mL 100mg/V V 10mL→ _____ mL 25mg/V V 5mL→ _____ mL
⑥	フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時	分	⑩	⑩	⑥ 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
⑥	側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	mL/h	時	分	⑩	⑩	⑥側管より 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
→終了時 生食50mL		300 mL/h	時	分	⑩	⑩	

化学療法指示書 (ポート・末梢)

ベクティビックス+IRI(大腸癌)

週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

- ① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
- ② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
- ③ ベクティビックス(6mg/kg) _____ mg
生食100mL (60分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
- ④ 生食100mL (単独で60分、経過観察) _____ 時 分 ⑩ ⑩
- ⑤ イリノテカン(150mg/m²) _____ mg 【遮光】
生食500mL (90分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
- 終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

- ① 総量 100 mL
- ② 総量 51 mL
- ③ 総量 _____ mL
ベクティビックス mL
400mg/20mL V
100mg/5mL V
- ⑤ 総量 _____ mL
イリノテカン mL
100mg/5mL V
40mg/2mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

アバスチン+IRIS(大腸癌)

注射をS-1 1、15日目に投与(S-1 2週投与、2週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ☆ S-1 _____ mg 分2 14日分

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 分 印 印

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 分 印 印

③ アバスチン(5mg/kg) _____ mg
生食100mL 初回90分 mL/h _____
2回目以降60分 mL/h _____ 時 分 印 印

④ 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 印 印

⑤ イリノテカン(125mg/m²) _____ mg 【遮光】
生食250mL (90分) mL/h _____ 時 分 印 印

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 印 印

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
アバスチン _____ mL
400mg/16mL V
100mg/4mL V

⑤ 総量 _____ mL
イリノテカン _____ mL
100mg/5mL V
40mg/2mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

IRIS(大腸癌)

注射をS-1 1、15日目に投与(S-1 2週投与、2週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ☆ S-1 _____ mg 分2 14日分

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ イリノテカン(125mg/m²) _____ mg 【遮光】
生食250mL (90分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
イリノテカン _____ mL
100mg/5mL V
40mg/2mL V

化学療法指示書

2枠

アバスチン+mFOLFOX6(大腸癌)(フューザーポンプ)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	印 印
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	印 印
③ アバスチン(5mg/kg or 10mg/kg) _____ mg 生食100mL 初回90分 2回目以降60分	mL/h	時 分	印 印
④ 生食50mL	300 mL/h	時 分	印 印
⑤ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	印 印
⑤側管より オキサリプラチン(85mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	印 印
⑥ フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	印 印
⑦ フルオロウラシル(2400mg/m ²) _____ mg 生食 _____ mL (46時間) ※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて	mL/h	時 分	印 印
→終了時 生食シリンジ10mL		時 分	印 印

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量 アバスチン		mL
400mg/16mL		V
100mg/4mL		V
⑤ 総量		mL
100mg/V V 10mL→		mL
25mg/V V 5mL→		mL
⑤側管より 総量 オキサリプラチン		mL
100mg/20mL		V
50mg/10mL		V
⑥ 総量 フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
⑦ 総量 フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
生食 mL		瓶

化学療法指示書

2枠

ベクティビックス+mFOLFOX6(大腸癌)(フューザーポンプ)

週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ ベクティビックス(6mg/kg) _____ mg
 生食100mL (60分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

④ 生食100mL (単独で60分、経過観察) _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑤ レボホリナート(200mg/m²) _____ mg
 5%ブドウ糖250mL (120分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑤側管より
 オキサリプラチン(85mg/m²) _____ mg
 5%ブドウ糖250mL (120分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑥ フルオロウラシル(400mg/m²) _____ mg
 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑦ フルオロウラシル(2400mg/m²) _____ mg
 生食 _____ mL (46時間) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
 ※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
 ベクティビックス _____ mL
 400mg/20mL V
 100mg/5mL V

⑤ 総量 _____ mL
 100mg/V V 10mL→ mL
 25mg/V V 5mL→ mL

⑤側管より 総量 _____ mL
 オキサリプラチン _____ mL
 100mg/20mL V
 50mg/10mL V

⑥ 総量 _____ mL
 フルオロウラシル _____ mL
 1000mg/20mL V
 250mg/5mL V

⑦ 総量 _____ mL
 フルオロウラシル _____ mL
 1000mg/20mL V
 250mg/5mL V
 生食 _____ mL 瓶

→終了時 生食シリンジ10mL

化学療法指示書

2枠

mFOLFOX6(大腸癌・胃癌)(フューザーポンプ)
週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

患者情報	投与情報	備考欄
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	① 総量 100 mL
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	② 総量 51 mL
③ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	③ 総量 _____ mL 100mg/V V 10mL→ mL 25mg/V V 5mL→ mL
③側管より オキサリプラチン(85mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩	③側管より 総量 _____ mL オキサリプラチン _____ mL 100mg/20mL V 50mg/10mL V
④ フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h	_____ 時 分 ⑩ ⑩	④ 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
⑤ フルオロウラシル(2400mg/m ²) _____ mg 生食 _____ mL (46時間) _____ mL/h ※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて	_____ 時 分 ⑩ ⑩	⑤ 総量 _____ mL フルオロウラシル _____ mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V 生食 _____ mL 瓶
→終了時 生食シリンジ10mL	_____ 時 分 ⑩ ⑩	

化学療法指示書 (ポート・末梢)

SIR(大腸癌)

注射をS-1 1日目に投与(S-1 2週投与、1週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ☆ S-1 _____ mg 分2 14日分

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ イリノテカン(150mg/m²) _____ mg 【遮光】
生食250mL (90分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
イリノテカン _____ mL
100mg/5mL V
40mg/2mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

アバスチン+SIR(大腸癌)

注射をS-1 1日目に投与(S-1 2週投与、1週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ☆ S-1 _____ mg 分2 14日分

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ アバスチン(7.5mg/kg) _____ mg
生食100mL 初回90分 mL/h _____
2回目以降60分 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

④ 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑤ イリノテカン(150mg/m²) _____ mg 【遮光】
生食250mL (90分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
アバスチン _____ mL
400mg/16mL V
100mg/4mL V

⑤ 総量 _____ mL
イリノテカン _____ mL
100mg/5mL V
40mg/2mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

アバスチン+SOX(大腸癌)

注射をS-1 1日目に投与(S-1 2週投与、1週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ☆ S-1 _____ mg 分2 14日分

① プロイメンド1V+生食100mL (30分) mL/h 時 分 印 印

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分) mL/h 時 分 印 印

③ アバスチン(7.5mg/kg) _____ mg
生食100mL 初回90分 mL/h
2回目以降60分 mL/h 時 分 印 印

④ 生食50mL 300 mL/h 時 分 印 印

⑤ オキサリプラチン(130mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖500mL (120分) mL/h 時 分 印 印

→終了時 生食50mL ポート末梢 300 mL/h 時 分 印 印
⑤の流速と同じ

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 mL
アバスチン mL
400mg/16mL V
100mg/4mL V

⑤ 総量 mL
オキサリプラチン mL
100mg/20mL V
50mg/10mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

SOX(大腸癌)

注射をS-1 1日目に投与(S-1 2週投与、1週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ☆ S-1 _____ mg 分2 14日分

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ オキサリプラチン(130mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖500mL (120分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL ポート末梢 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
③の流速と同じ

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
オキサリプラチン _____ mL
100mg/20mL V
50mg/10mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

アバステン+カペシタビン(大腸癌)

注射をカペシタビン1日目に投与(カペシタビン 2週投与、1週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ☆ カペシタビン _____ mg 分2 14日分 1日目夕から内服
(2000mg/m²/day)

* 生食シリンジ10mL

① アバステン(7.5mg/kg) _____ mg
生食100mL 初回90分 mL/h
2回目以降60分 mL/h _____ 時 分 ㊦ ㊦

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ㊦ ㊦

備考欄

① 総量 _____ mL
アバステン _____ mL
400mg/16mL V
100mg/4mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

ベクティビックス(大腸癌)

週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

- ① 生食100mL+オルガドロン3.8mg 1A (30分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
- ② ベクティビックス(6mg/kg) _____ mg
生食100mL (60分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
- ③ 生食100mL (単独で60分、経過観察) _____ 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

- ① 総量 101 mL
- ② 総量 _____ mL
ベクティビックス mL
400mg/20mL V
100mg/5mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

アバステチン+ロンサーフ (大腸癌)

臨時

アバステチンは週1回1週投与1週休薬

ロンサーフは5日服用2日休薬を2週間、その後2週休薬

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ☆ ロンサーフ _____ mg 分2 10日分 1日目夕から内服

* 生食シリンジ10mL

① アバステチン (5mg/kg) _____ mg
生食100mL 初回90分 mL/h
2回目以降60分 mL/h 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 _____ mL
アバステチン _____ mL
400mg/16mL V
100mg/4mL V