

化学療法指示書

2枠

FOLFIRINOX(膵臓癌)(フューザーポンプ)

週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ オキサリプラチン(85mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖250mL (120分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

④ レボホリナート(200mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖250mL (120分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

④側管より 【遮光】
イリノテカン(180mg/m²) _____ mg
生食250mL (90分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑤ フルオロウラシル(400mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖50mL

300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑥ フルオロウラシル(2400mg/m²) _____ mg
生食 _____ mL (46時間) _____ mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて

→終了時 生食シリンジ10mL

_____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
オキサリプラチン _____ mL
100mg/20mL V
50mg/10mL V

④ 総量 _____ mL
100mg/V V 10mL→ mL
25mg/V V 5mL→ mL

④側管より 総量 _____ mL
イリノテカン _____ mL
100mg/5mL V
40mg/2mL V

⑤ 総量 _____ mL
フルオロウラシル _____ mL
1000mg/20mL V
250mg/5mL V

⑥ 総量 _____ mL
フルオロウラシル _____ mL
1000mg/20mL V
250mg/5mL V
生食 _____ mL 瓶

化学療法指示書

FOLFIRINOX(膵臓癌)(ポート)

週1回1週投与、1週休み

2枠

患者名		診断名	
身長	cm 体重	kg 体表面積	m ²
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩	① 総量	100 mL
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩	② 総量	51 mL
③ オキサリプラチン(85mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩	③ 総量 オキサリプラチン 100mg/20mL 50mg/10mL	mL mL V V
④ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩	④ 総量 100mg/V V 10mL→ 25mg/V V 5mL→	mL mL mL
④側管より 【遮光】 イリノテカン(180mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩	④側管より 総量 イリノテカン 100mg/5mL 40mg/2mL	mL mL V V
⑤ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩	⑤ 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL 250mg/5mL	mL mL V V
⑤側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h	時 分 ⑩ ⑩	⑤側管より 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL 250mg/5mL	mL mL V V
<2日目> 月 日 ()			
⑥ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (23時間)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩	⑥ 総量 フルオロウラシル 1000mg/20mL 250mg/5mL	mL mL V V
→終了時 生食50mL	300 mL/h 時 分 ⑩ ⑩		

化学療法指示書

FOLFIRINOX(膵臓癌)(末梢)

週1回1週投与、1週休み

2枠

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ オキサリプラチン(85mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖500mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④ レボホリナート(200mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④側管より 【遮光】 イリノテカン(180mg/m ²) _____ mg 生食250mL (90分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑤側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩
<2日目> 月 日 ()			
⑥ フルオロウラシル(1200mg/m ²) _____ mg ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL+ユエキンキープ500mL (23時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩

備考欄			
① 総量	100	mL	
② 総量	51	mL	
③ 総量		mL	
オキサリプラチン		mL	
100mg/20mL		V	
50mg/10mL		V	
④ 総量		mL	
100mg/V	V 10mL→	mL	
25mg/V	V 5mL→	mL	
④側管より 総量		mL	
イリノテカン		mL	
100mg/5mL		V	
40mg/2mL		V	
⑤ 総量		mL	
フルオロウラシル		mL	
1000mg/20mL		V	
250mg/5mL		V	
⑤側管より 総量		mL	
フルオロウラシル		mL	
1000mg/20mL		V	
250mg/5mL		V	
⑥ 総量		mL	
フルオロウラシル		mL	
1000mg/20mL		V	
250mg/5mL		V	

化学療法指示書（ポート・末梢）

GC療法（胆道癌）

週1回2週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm 体重	kg 体表面積	m ²
月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)		備考欄	
mL/h	時 分 ⑩ ⑩	① 総量	100 mL
側管より(①と同時に開始し、連続投与)			
(側一1) 生食500ml (90分)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩		
(側一2) 生食500mL (90分)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩		
(側一3) 生食500mL (90分)	mL/h 時 分 ⑩ ⑩		
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)		② 総量 51 mL	
mL/h	時 分 ⑩ ⑩		
③ シスプラチン(25mg/m ²) _____ mg 生食250mL (60分)		③ 総量 _____ mL シスプラチン _____ mL 50mg/100mL V 10mg/20mL V	
mL/h	時 分 ⑩ ⑩		
④ ゲムシタビン(1000mg/m ²) _____ mg 生食100mL (30分)		④ 総量 _____ mL ゲムシタビン _____ mL 1000mg/25mL V 200mg/5mL V ※ゲムシタビンの量が50mL以上の時は生食50mLを抜いてから混注	
mL/h	時 分 ⑩ ⑩		
⑤ マンニトール注20%300mL (45分)			
400 mL/h	時 分 ⑩ ⑩		

化学療法指示書（ポート・末梢）

GEM療法（膵・胆道癌）

週1回3週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
月	日	()	
①	{	グラニセトロン3mg/バッグ1袋	
		アロキシ点滴静注バッグ1袋	
	(15分)	mL/h	時 分 ⑩ ⑩
②	ゲムシタビン(1000mg/m ²)	_____mg	
	生食100mL (30分)	mL/h	時 分 ⑩ ⑩
→終了時	生食50mL	300 mL/h	時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 50 mL

② 総量 _____ mL

ゲムシタビン _____ mL

1000mg/25mL _____ V

200mg/5mL _____ V

※ゲムシタビンの量が50mL以上の時は生食50mLを抜いてから混注

化学療法指示書（ポート・末梢）

アブラキサン+GEM療法（膵臓癌）

週1回3週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 () _____

① { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ アブラキサン(125mg/m²) _____ mg
 生食100mL (30分以上かけて) _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
 * インラインフィルターは使用しない

④ 生食50mL (③と同じ流速で) _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑤ ゲムシタビン(1000mg/m²) _____ mg
 生食100mL (30分) _____ mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
 100mg/V _____ V
 20mL→ _____ mL
 1Vあたり生食20mLで溶解
 ボトルに残った生食は全て抜き取り、空のボトルに懸濁液を注入する

⑤ 総量 _____ mL
 ゲムシタビン _____ mL
 1000mg/25mL _____ V
 200mg/5mL _____ V
 ※ゲムシタビンの量が50mL以上の時は生食50mLを抜いてから混注

特定生物由来製剤(アブラキサン)

* 血液製剤使用表必要
 医薬品名、ロット番号記載