

化学療法指示書 (ポート・末梢)

DTX(胃癌・食道癌・乳癌)

週1回1週投与、2週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ ドセタキセル(70mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
ドセタキセル _____ mL
80mg/4mL V
20mg/1mL V

化学療法指示書

FP 1日目(食道癌)

週1回1週投与、2or3週休み(2コースで終了)

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ フルオロウラシル(800mg/m ²) _____mg エルネオパNF1号2000mL	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より A シスプラチン(80mg/m ²) _____mg 生食250mL (生食500mL 0.5袋) (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より B フロセミド1A+生食50mL (全開)		時 分	⑩ ⑩
③側管より C ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より D ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より E ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	⑩ ⑩

備考欄

① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
③側管より 総量		mL
シスプラチン		mL
50mg/100mL	V	連結管
10mg/20mL		V
(生食250mL抜く)		
③側管より 総量	52	mL

化学療法指示書

FP 2日目(食道癌)

週1回1週投与、2or3週休み(2コースで終了)

患者名		診断名				
<2日目>	月 日 ()	身長	cm 体重	kg	体表面積	m ²
① オルガドロン3.8mg 1A+生食50mL	(15分)	mL/h	時 分	印 印	備考欄	
② フルオロウラシル(800mg/m ²) _____ mg エルネオパNF1号2000mL	mL/h	時 分	印 印	① 総量	51	mL
②側管より					② 総量	mL
A ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	印 印		フルオロウラシル	mL
②側管より					1000mg/20mL	V
B ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	印 印		250mg/5mL	V
②側管より						
C ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	印 印			

化学療法指示書

FP 3～5日目(食道癌)

週1回1週投与、2or3週休み(2コースで終了)

患者名		診断名		
<3日目・4日目・5日目>	月 日	身長 () cm	体重 kg	体表面積 m ²
① フルオロウラシル(800mg/m ²) エルネオパNF1号2000mL	_____ mg	mL/h	時 分 印 印	備考欄 ① 総量 フルオロウラシル mL 1000mg/20mL V 250mg/5mL V
①側管より A ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分 印 印		
①側管より B ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分 印 印		
①側管より C ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分 印 印		

化学療法指示書

FP+LV 1日目(食道癌)

週1回1週投与、2or3週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	印 印
② アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A (15分)	mL/h	時 分	印 印
③ フルオロウラシル(800mg/m ²) _____mg エルネオパNF1号2000mL	mL/h	時 分	印 印
F:時間指定あり			
③側管より			
A シスプラチン(80mg/m ²) _____mg 生食250mL (生食500mL 0.5袋) (120分)	mL/h	時 分	印 印
③側管より			
B フロセミド1A+生食50mL (全開)		時 分	印 印
③側管より			
C ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	印 印
③側管より			
D ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	印 印
③側管より			
E ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	印 印
③側管より i.v.			
F ロイコボリン9mg(3A) (12時・16時・22時)		時 分	印 印
		時 分	印 印
		時 分	印 印

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
③側管より 総量		mL
シスプラチン		mL
50mg/100mL	V	連結管
10mg/20mL		V
(生食250mL抜く)		
③側管より 総量	52	mL

化学療法指示書

FP+LV 2日目(食道癌)

週1回1週投与、2or3週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<2日目> 月 日 ()			
① オルガドロン3.8mg 1A+生食50mL	(15分)		
	mL/h	時 分	印 印
② フルオロウラシル(800mg/m ²) _____ mg			
エルネオパNF1号2000mL	mL/h	時 分	印 印
備考欄			
① 総量		51	mL
② 総量			mL
フルオロウラシル			mL
1000mg/20mL			V
250mg/5mL			V
D: 時間指定あり			
②側管より			
A ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	印 印
②側管より			
B ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	印 印
②側管より			
C ソルラクトS500mL	200 mL/h	時 分	印 印
②側管より i.v.			
D ロイコボリン9mg(3A)	(12時・16時・22時)	時 分	印 印
		時 分	印 印
		時 分	印 印

化学療法指示書

FP+LV 3~5日目(食道癌)

週1回1週投与、2or3週休み

患者名		診断名		
<3日目・4日目・5日目>	月 日	身長 () cm	体重 kg	体表面積 m ²
① フルオロウラシル(800mg/m ²)	_____ mg	_____ mL/h	_____ 時 分 ⑩ ⑩	備考欄
エルネオパNF1号2000mL				① 総量 _____ mL
				フルオロウラシル _____ mL
				1000mg/20mL _____ V
				250mg/5mL _____ V
D: 時間指定あり				
①側管より				
A ソルラクトS500mL	200 mL/h	_____ 時 分 ⑩ ⑩		
①側管より				
B ソルラクトS500mL	200 mL/h	_____ 時 分 ⑩ ⑩		
①側管より				
C ソルラクトS500mL	200 mL/h	_____ 時 分 ⑩ ⑩		
①側管より i.v.				
D ロイコボリン9mg(3A)	(12時・16時・22時)	_____ 時 分 ⑩ ⑩		
		_____ 時 分 ⑩ ⑩		
		_____ 時 分 ⑩ ⑩		

化学療法指示書

ショートFP+LV 1日目(食道癌)
週1回1週投与、2or3週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② アロキシ点滴静注バッグ1袋+ オルガドロン3.8mg 2A+オルガドロン1.9mg 1A (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ フルオロウラシル(800mg/m ²) _____ mg 生食500mL	mL/h	(24時間) 時 分	⑩ ⑩
E: 時間指定あり			
③側管より A ソルラクトS500mL + 硫酸Mg 5mL(硫酸Mg20mL 0.25A) (60分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より B マンニトール注100mL (マンニトール注300mL 0.33瓶) (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より C シスプラチン(80mg/m ²) _____ mg 生食250mL (生食500mL 0.5袋) (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より D ソルラクトS500mL + 硫酸Mg 5mL(硫酸Mg20mL 0.25A) (60分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より i.v. E ロイコボリン9mg(3A) (12時・16時・22時)		時 分	⑩ ⑩
		時 分	⑩ ⑩
		時 分	⑩ ⑩

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	52.5	mL
③ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL		V
250mg/5mL		V
③側管より 総量	505	mL
③側管より 総量	100	mL
(マンニトール注200mL抜く)		
③側管より 総量		mL
シスプラチン		mL
50mg/100mL	V	連結管
10mg/20mL		V
(生食250mL抜く)		
③側管より 総量	505	mL

※ 硫酸Mg 1AでAとDを調整

化学療法指示書

ショートFP+LV 2日目(食道癌)

週1回1週投与、2or3週休み

患者名 _____ 診断名 _____

	身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
<2日目>	月	日	()			
① オルガドロン3.8mg 2A+生食50mL	(15分)				備考欄	
	mL/h	時	分	印	① 総量	52 mL
② フルオロウラシル(800mg/m ²) _____ mg	(24時間)				② 総量	mL
生食500mL	mL/h	時	分	印	フルオロウラシル	mL
					1000mg/20mL	V
					250mg/5mL	V
A: 時間指定あり						
②側管より i.v.						
A ロイコボリン9mg(3A) (12時・16時・22時)		時	分	印		
		時	分	印		
		時	分	印		

化学療法指示書

ショートFP+LV 3~5日目(食道癌)
週1回1週投与、2or3週休み

患者名 _____ 診断名 _____

<3日目・4日目・5日目>	月	日	身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
			()					
① フルオロウラシル(800mg/m ²)			_____ mg		(24時間)			
生食500mL			mL/h		時 分 ⑩ ⑩			
A: 時間指定あり								
①側管より i.v.								
A ロイコボリン9mg(3A)		(12時・16時・22時)			時 分 ⑩ ⑩			
					時 分 ⑩ ⑩			
					時 分 ⑩ ⑩			

備考欄
① 総量 _____ mL
フルオロウラシル _____ mL
1000mg/20mL _____ V
250mg/5mL _____ V

パクリタキセル	Day	1	8	15	22	29	36	43	49
		↓	↓	↓	↓	↓	↓		

患者名 _____

	西暦		年		最終施行日から2カ月有効	
コース	-	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)
医師						
看護師	/	/	/	/	/	/
会計						
薬局						
調剤						
調製						

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					