

化学療法指示書（ポート・末梢）

CAPOX（大腸癌・胃癌）

注射をカペシタビン1日目に投与（カペシタビン 2週投与、1週休）

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ☆ カペシタビン _____ mg 分2 14日分 1日目夕から内服
(2000mg/m²/day)

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A _____ }
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ オキサリプラチン(130mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL ポート末梢 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
③の流速と同じ

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
オキサリプラチン _____ mL
100mg/20mL V
50mg/10mL V

化学療法指示書（ポート・末梢）

CPT-11（胃癌・大腸癌）

週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
 月 _____ 日 ()

- ① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- ② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- ③ イリノテカン(150mg/m²) _____ mg 【遮光】
 生食500mL (90分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- 終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄
 ① 総量 100 mL
 ② 総量 51 mL
 ③ 総量 _____ mL
 イリノテカン _____ mL
 100mg/5mL V
 40mg/2mL V

化学療法指示書（ポート・末梢）

CPT-11+CDDP(胃癌)

週1回4週投与、その後週1回投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
月	日	()	
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時	分 ⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時	分 ⑩ ⑩
③ イリノテカン(60mg/m ²) _____mg 【遮光】 シスプラチン(6mg/m ²) _____mg 生食500mL (90分)	mL/h	時	分 ⑩ ⑩
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時	分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
イリノテカン _____ mL
100mg/5mL _____ V
40mg/2mL _____ V
シスプラチン _____ mL
10mg/20mL _____ V

化学療法指示書（ポート・末梢）

DTX(胃癌・食道癌・乳癌)

週1回1週投与、2週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ ドセタキセル(70mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
ドセタキセル _____ mL
80mg/4mL V
20mg/1mL V

化学療法指示書（ポート・末梢）

FOLFOX4(大腸癌・胃癌)

週1回1週投与、1週休み

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
<1日目> 月 日 ()			
① プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③ レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
③側管より オキサリプラチン(85mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖500mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
④側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL ポート 300 mL/h 末梢 ③側管の流速と同じ	mL/h	時 分	⑩ ⑩
<2日目> 月 日 ()			
⑤ レボホリナート(100mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖250mL (120分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥ フルオロウラシル(600mg/m ²) _____ mg ソルデム3A1000mL (22時間)	mL/h	時 分	⑩ ⑩
⑥側管より フルオロウラシル(400mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖50mL 300 mL/h	mL/h	時 分	⑩ ⑩
→終了時 生食50mL	300 mL/h	時 分	⑩ ⑩

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
③側管より 総量		mL
オキサリプラチン		mL
100mg/20mL	V	
50mg/10mL	V	
④ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL	V	
250mg/5mL	V	
④側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL	V	
250mg/5mL	V	
⑤ 総量		mL
100mg/V	V 10mL→	mL
25mg/V	V 5mL→	mL
⑥ 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL	V	
250mg/5mL	V	
⑥側管より 総量		mL
フルオロウラシル		mL
1000mg/20mL	V	
250mg/5mL	V	

化学療法指示書

2枠

mFOLFOX6(大腸癌・胃癌)(フューザーポンプ)

週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ レボホリナート(200mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖250mL (120分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③側管より
オキサリプラチン(85mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖250mL (120分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

④ フルオロウラシル(400mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖50mL

300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑤ フルオロウラシル(2400mg/m²) _____ mg
生食 _____ mL (46時間) _____ mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
※対応表の生食量で調整し、携帯ポンプで46時間かけて

→終了時 生食シリンジ10mL

_____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
100mg/V V 10mL→ mL
25mg/V V 5mL→ mL

③側管より 総量 _____ mL
オキサリプラチン _____ mL
100mg/20mL V
50mg/10mL V

④ 総量 _____ mL
フルオロウラシル _____ mL
1000mg/20mL V
250mg/5mL V

⑤ 総量 _____ mL
フルオロウラシル _____ mL
1000mg/20mL V
250mg/5mL V
生食 _____ mL 瓶

化学療法指示書（ポート・末梢）

PTX(胃癌・乳癌)

週1回3週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

- ① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- ② オルガドロン3.8mg 2A+ガスター1A+生食50mL (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- ③ { $\frac{\text{グラニセトロン3mg/バッグ1袋}}{\text{アロキシ点滴静注バッグ1袋}}$ } (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- ④ パクリタキセル(80mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- 終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

- ① 総量 100 mL
- ② 総量 54 mL
- ③ 総量 50 mL
- ④ 総量 _____ mL
パクリタキセル mL
100mg/16.7mL V
30mg/5mL V

化学療法指示書（ポート・末梢）

S-1+CDDP（胃癌）

S-1投与開始から8日目に投与（S-1 3週投与2週休み）

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

<1日目> _____ 月 _____ 日 ()

内服 ☆ S-1 _____ mg 分2 21日分

① ユエキン500mL (120分) ←病棟常備より使用
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② ユエキン500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

②側管より連続投与

(側-1) プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩

(側-2) アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ シスプラチン(60mg/m²) _____ mg
生食500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

④ マンニトール注20%300mL (45分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑤ ソルラクトS500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑥ ソルラクトS500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑦ ソルデム3A1000mL (10時間) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑧ ソルラクトS500mL (5時間) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

<2日目> _____ 月 _____ 日 ()

⑨ ユエキン500mL (6時間) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑨側管より
オルガドロン3.8mg 1A+生食50mL (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑩ ソルラクトS500mL (6時間) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑪ ユエキン500mL (6時間) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑫ ソルラクトS500mL (6時間) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

(側-1) 総量 100 mL

(側-2) 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
シスプラチン _____ mL
50mg/100mL V 連結管
10mg/20mL V

⑨側管より 総量 51 mL

払い出し時テープで貼り付ける

化学療法指示書（ポート・末梢）

S-1+DTX(胃癌)

週1回1週投与、2週休み

注射をS-1 1日目に投与(S-1 2週投与、1週休)

患者名

診断名

身長

cm

体重

kg

体表面積

m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

☆ S-1 _____mg 分2 14日分

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)

mL/h 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)

mL/h 時 分 ⑩ ⑩

③ ドセタキセル(40mg/m²) _____mg
生食250mL (60分)

mL/h 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL

300 mL/h 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 mL
ドセタキセル mL
80mg/4mL V
20mg/1mL V

化学療法指示書（ポート・末梢）

SOX(胃癌)

注射をS-1 1日目に投与(S-1 2週投与、1週休)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ☆ S-1 _____ mg 分2 14日分

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ オキサリプラチン(100mg/m²) _____ mg
5%ブドウ糖500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL ポート末梢 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
③の流速と同じ

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
オキサリプラチン _____ mL
100mg/20mL V
50mg/10mL V

化学療法指示書（ポート・末梢）

アブラキサン（乳癌・胃癌）

週1回1週投与、2週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

備考欄

① アブラキサン(220mg/m²) _____ mg
生食100mL（30分） _____ mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
* インラインフィルターは使用しない

① 総量 _____ mL
100mg/V _____ V
20mL→ _____ mL

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

1Vあたり生食20mLで溶解
ボトルに残った生食は全て抜き取り、空のボトルに懸濁液を注入する

特定生物由来製剤

* 血液製剤使用表必要
医薬品名、ロット番号記載

化学療法指示書（ポート・末梢）

オプジーボ（胃癌）

週1回1週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
月 _____ 日 ()

① オプジーボ 240mg 1V
生食 76mL（30分以上かけて） mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
※計100mLとする
* インラインフィルター使用

備考欄

① 総量 100 mL
オプジーボ 24 mL
240mg/24mL 1 V
生食100mL 0.76 瓶
(生食24mL抜く)

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

化学療法指示書（ポート・末梢）

トラスツズマブ+カペシタビン+シスプラチン（胃癌） （初回）

注射をカペシタビン1日目に投与（カペシタビン 2週投与、1週休）

患者名		診断名	
身長	cm	体重	kg
体表面積	m ²		
月	日	()	
内服	☆ カペシタビン _____ mg	分2	14日分
	(2000mg/m ² /day)		1日目夕から内服
	★ ロキソプロフェンNa(60)	1錠	直前
①	プロイメンド1V+生食100mL (30分)	mL/h	時 分 ⑩
②	{ グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)	mL/h	時 分 ⑩ ⑩
③	トラスツズマブ(8mg/kg) _____ mg 生食250mL (90分) 大塚蒸留水20mL _____ A	mL/h	時 分 ⑩ ⑩
④	生食50mL	300 mL/h	時 分 ⑩ ⑩
⑤	シスプラチン(80mg/m ²) _____ mg 生食250mL (生食500mL 0.5袋)(120分)	mL/h	時 分 ⑩ ⑩
⑥	ソルラクトS500mL (120分)	mL/h	時 分 ⑩ ⑩
⑥	側管より フロセミド1A+生食50mL (全開)		時 分 ⑩ ⑩
⑦	ユエキン500mL (120分)	mL/h	時 分 ⑩ ⑩
⑧	ソルラクトS500mL (120分)	mL/h	時 分 ⑩ ⑩
⑨	ユエキン500mL (120分)	mL/h	時 分 ⑩ ⑩
⑩	ソルラクトS500mL (120分)	mL/h	時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 mL
150mg/7.2mL V
7.2mL→ mL
60mg/3mL V
3mL→ mL

⑤ 総量 mL
シスプラチン mL
50mg/100mL V 連結管
10mg/20mL V
(生食250mL抜く)

⑥側管より 総量 52 mL

化学療法指示書（ポート・末梢）

トラスツズマブ+カペシタビン+シスプラチン（胃癌） （2回目以降）

注射をカペシタビン1日目に投与（カペシタビン 2週投与、1週休）

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ☆ カペシタビン _____ mg 分2 14日分 1日目夕から内服
(2000mg/m²/day)
★ ロキソプロフェンNa(60) 1錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ トラスツズマブ(6mg/kg) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
大塚蒸留水20mL _____ A

④ 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑤ シスプラチン(80mg/m²) _____ mg
生食250mL (生食500mL 0.5袋)(120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑥ ソルラクトS500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑥側管より
フロセミド1A+生食50mL (全開) _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑦ ユエキン500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑧ ソルラクトS500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑨ ユエキン500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑩ ソルラクトS500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
150mg/7.2mL V
7.2mL→ mL
60mg/3mL V
3mL→ mL

⑤ 総量 _____ mL
シスプラチン _____ mL
50mg/100mL V 連結管
10mg/20mL V
(生食250mL抜く)

⑥側管より 総量 52 mL

化学療法指示書（ポート・末梢）

カペシタビン+シスプラチン（胃癌）

注射をカペシタビン1日目に投与（カペシタビン 2週投与、1週休）

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ☆ カペシタビン _____ mg 分2 14日分 1日目夕から内服
(2000mg/m²/day)

① プロイメンド1V+生食100mL (30分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ シスプラチン(80mg/m²) _____ mg
生食250mL (生食500mL 0.5袋)(120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

④ ソルラクトS500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

④側管より
フロセミド1A+生食50mL (全開) _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑤ ユエキン500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑥ ソルラクトS500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑦ ユエキン500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑧ ソルラクトS500mL (120分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
シスプラチン _____ mL
50mg/100mL V 連結管
10mg/20mL V
(生食250mL抜く)

④側管より 総量 52 mL

化学療法指示書
サイラムザ(胃癌)
週1回1週投与1週休み

(ポート・末梢)

臨時

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

備考欄

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

* 生食シリンジ10mL

① サイラムザ(8mg/kg) _____ mg
生食250mL (60分) _____ mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

① 総量 _____ mL
サイラムザ _____ mL
500mg/50mL V
100mg/10mL V

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

化学療法指示書A (ポート・末梢)

サイラムザ+PTX(胃癌)

A→B→A→1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② オルガドロン3.8mg 2A+ガスター1A+生食50mL (15分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ { グラニセトロン3mg/バッグ1袋
アロキシ点滴静注バッグ1袋 } (15分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

④ 生食50mL

300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑤ サイラムザ(8mg/kg) _____ mg
生食250mL (60分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑥ 生食50mL

300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

⑦ パクリタキセル(80mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL

300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 54 mL

③ 総量 50 mL

⑤ 総量
サイラムザ mL
500mg/50mL V
100mg/10mL V

⑦ 総量
パクリタキセル mL
100mg/16.7mL V
30mg/5mL V

2018.6 最成病院化学療法

西暦 _____ 年

最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

化学療法指示書B (ポート・末梢) A→B→A→1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② オルガドロン3.8mg 2A+ガスター1A+生食50mL (15分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ { $\frac{\text{グラニセトロン}3\text{mg}/\text{バッグ}1\text{袋}}{\text{アロキシ点滴静注バッグ}1\text{袋}}$ } (15分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

④ パクリタキセル(80mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分)

mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL

300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 54 mL

③ 総量 50 mL

④ 総量
パクリタキセル
100mg/16.7mL
30mg/5mL
mL
mL
V
V

2018.6 最成病院化学療法

最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

	Day	1	8	15	22	28
パクリタキセル		↓	↓	↓		
サイラムザ		↓		↓		

化学療法指示書A (ポート・末梢)

サイラムザ+アブラキサン (胃癌)

臨時

サイラムザは週1回1週投与、1週休み

アブラキサンは週1回1週投与、3週休み(A-1週休み-B-1週休み)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

* 生食シリンジ10mL

① サイラムザ(8mg/kg) _____ mg
生食250mL (60分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② 生食100mL (単独で60分、経過観察)

③ アブラキサン(220mg/m²) _____ mg
生食100mL (30分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
* インラインフィルターは使用しない

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

特定生物由来製剤

* 血液製剤使用表必要
医薬品名、ロット番号記載

備考欄

① 総量 _____ mL
サイラムザ _____ mL
500mg/50mL _____ V
100mg/10mL _____ V

③ 総量 _____ mL
100mg/V _____ V
20mL→ _____ mL

1Vあたり生食20mLで溶解
ボトルに残った生食は全て抜き取り、空のボトルに懸濁液を注入する

最成病院化学療法

西暦 _____ 年

最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

化学療法指示書B (ポート・末梢)

サイラムザ+アブラキサン (胃癌)

臨時

サイラムザは週1回1週投与、1週休み

アブラキサンは週1回1週投与、3週休み(A-1週休み-B-1週休み)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

* 生食シリンジ10mL

① サイラムザ(8mg/kg) _____ mg
生食250mL (60分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h

備考欄

① 総量
サイラムザ
500mg/50mL mL
100mg/10mL mL
V
V

最成病院化学療法

最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

	Day	1	8	15	22	28
アブラキサン		↓				
サイラムザ		↓		↓		