

化学療法指示書 (ポート・末梢)

DTX(胃癌・食道癌・乳癌)

週1回1週投与、2週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ ドセタキセル(70mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 51 mL

③ 総量 _____ mL
ドセタキセル _____ mL
80mg/4mL V
20mg/1mL V

化学療法指示書 (ポート・末梢)

DTX+パージェタ+トラスツズマブ(3週毎)(乳癌)

週1回1週投与、2週休み(初回)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ロキソプロフェンNa 1錠 直前
 ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A _____ } (15分)
 アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

③ パージェタ420mg 2V+生食250mL (60分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

④ 生食100mL (60分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑤ トラスツズマブ(8mg/kg) _____ mg
 生食250mL (90分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
 大塚蒸留水20mL _____ A

⑥ 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑦ ドセタキセル(75mg/m²) _____ mg
 生食250mL (60分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

備考欄		
① 総量	100	mL
② 総量	51	mL
③ 総量	278	mL
パージェタ	28	mL
420mg/14mL	2	V
⑤ 総量		mL
150mg/7.2mL		V
	7.2mL→	mL
60mg/3mL		V
	3mL→	mL
⑦ 総量		mL
ドセタキセル		mL
80mg/4mL		V
20mg/1mL		V

2020.1 最成病院化学療法

西暦 年

コース	1
月/日()	/ ()
時間	:
当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)
医師	
看護師	/
会計	
薬局	
調剤	
調製	

化学療法指示書 (ポート・末梢)

DTX+パージェタ+トラスツズマブ(3週毎)(乳癌)

週1回1週投与、2週休み(2回目以降)

患者名		診断名				
	身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
月	日	()				
内服	★ ロキソプロフェンNa(60)	1錠	直前			
	ポララミン(2)	2錠	直前			
①	プロイメンド1V+生食100mL	(30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	備考欄 ① 総量 100 mL
②	{ グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A }	(15分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	② 総量 51 mL
③	パージェタ420mg 1V+生食250mL	(30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	③ 総量 264 mL パージェタ 14 mL 420mg/14mL 1 V
④	生食50mL	(30分)	mL/h	時 分	⑩ ⑩	
⑤	トラスツズマブ(6mg/kg)	_____ mg	mL/h	時 分	⑩ ⑩	⑤ 総量 _____ mL 150mg/7.2mL V 7.2mL→ mL
	生食250mL (60分)					
	大塚蒸留水20mL _____ A					60mg/3mL V 3mL→ mL
⑥	生食50mL	300	mL/h	時 分	⑩ ⑩	
⑦	ドセタキセル(75mg/m ²)	_____ mg	mL/h	時 分	⑩ ⑩	⑦ 総量 _____ mL ドセタキセル mL 80mg/4mL V 20mg/1mL V
	生食250mL (60分)					
→終了時	生食50mL	300	mL/h	時 分	⑩ ⑩	

化学療法指示書 (ポート・末梢)

DTX+パージェタ+ハーセプチン(3週毎)(乳癌)

週1回1週投与、2週休み(2回目以降)

患者名		診断名					
		身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
月 日 ()							
内服	★ ロキソプロフェンNa(60) ポララミン(2)	1錠 2錠	直前 直前				
①	プロイメンド1V+生食100mL (30分)		mL/h	時 分	印 印	備考欄 ① 総量	100 mL
②	{ グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)		mL/h	時 分	印 印	② 総量	51 mL
③	パージェタ420mg 1V+生食250mL (30分)		mL/h	時 分	印 印	③ 総量 パージェタ 420mg/14mL	264 mL 14 mL 1 V
④	生食50mL (30分)		mL/h	時 分	印 印		
⑤	ハーセプチン(6mg/kg) 生食250mL (60分)	_____ mg	mL/h	時 分	印 印	⑤ 総量 150mg/7.2mL 7.2mL→	mL V mL
⑥	生食50mL	300	mL/h	時 分	印 印	60mg/3mL 3mL→	V mL
⑦	ドセタキセル(75mg/m ²) 生食250mL (60分)	_____ mg	mL/h	時 分	印 印	⑦ 総量 ドセタキセル 80mg/4mL 20mg/1mL	mL mL V V
→終了時 生食50mL			300	mL/h	時 分	印 印	

化学療法指示書 (ポート・末梢)

FEC100(乳癌)

週1回1週投与、2週休み(4コース)

患者名 _____

診断名 _____

身長 _____

cm 体重 _____

kg

体表面積 _____

m²

月 日 ()

ケモセーフロック輸液セット使用

備考欄

1本目にバックスパイ
つける

① プロイメンド1V+生食100mL (30分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

① 総量 100 mL

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
 { アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② 総量 51 mL

③ エピルビシン(100mg/m²) _____ mg
 生食 _____ mL (15分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
 ※計100mLとする

③ 総量 100 mL
 エピルビシン mL
 50mg/25mL V
 10mg/5mL V
 生食100mL 瓶
 (生食 _____ mL 抜く) 21G

④ エンドキサン(600mg/m²) _____ mg
 生食250mL (60分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

④ 総量 _____ mL
 500mg/V V 25mL→ mL

↩ ⑤以降は側管ルートより投与

⑤ 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑥ フルオロウラシル(500mg/m²) _____ mg
 生食100mL (60分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

⑥ 総量 _____ mL
 フルオロウラシル mL
 1000mg/20mL V
 250mg/5mL V

→終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

翌日のジーラスタ

初回は無し

2回目以降

有

無

化学療法指示書 (ポート・末梢)

PTX(胃癌・乳癌)

週1回3週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h 時 分 印 印

② オルガドロン3.8mg 2A+ガスター1A+生食50mL (15分)
mL/h 時 分 印 印

③ { グラニセトロン3mg/バッグ1袋
アロキシ点滴静注バッグ1袋 } (15分)
mL/h 時 分 印 印

④ パクリタキセル(80mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h 時 分 印 印

→終了時 生食50mL 300 mL/h 時 分 印 印

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 54 mL

③ 総量 50 mL

④ 総量 mL
パクリタキセル mL
100mg/16.7mL V
30mg/5mL V

化学療法指示書A (ポート・末梢)

アバスチン+PTX(乳癌)

パクリタキセルは週1回3週投与、1週休み。

アバスチンは週1回1週投与、1週休み。(A-B-A-1週休み)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)

mL/h 時 分 印 印

備考欄

① 総量 100 mL

② オルガドロン3.8mg 2A+ガスター1A+生食50mL (15分)

mL/h 時 分 印 印

② 総量 54 mL

③ { グラニセトロン3mg/バッグ1袋
アロキシ点滴静注バッグ1袋 } (15分)

mL/h 時 分 印 印

③ 総量 50 mL

④ パクリタキセル(90mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分)

mL/h 時 分 印 印

④ 総量 _____ mL
パクリタキセル _____ mL
100mg/16.7mL V
30mg/5mL V

⑤ 生食50mL 300 mL/h 時 分 印 印

⑥ アバスチン(10mg/kg) _____ mg
生食100mL 初回90分
2回目以降60分

mL/h 時 分 印 印

⑥ 総量 _____ mL
アバスチン _____ mL
400mg/16mL V
100mg/4mL V

→終了時 生食50mL 300 mL/h 時 分 印 印

2018.6 最成病院化学療法

西暦 年

最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)					
入院中(階)					
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

化学療法指示書B (ポート・末梢)

アバスチン+PTX(乳癌)

パクリタキセルは週1回3週投与、1週休み。

アバスチンは週1回1週投与、1週休み。(A-B-A-1週休み)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)

mL/h 時 分 印 印

② オルガドロン3.8mg 2A+ガスター1A+生食50mL (15分)

mL/h 時 分 印 印

③ { グラニセトロン3mg/バッグ1袋
アロキシ点滴静注バッグ1袋 } (15分)

mL/h 時 分 印 印

④ パクリタキセル(90mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分)

mL/h 時 分 印 印

→終了時 生食50mL

300 mL/h 時 分 印 印

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 54 mL

③ 総量 50 mL

④ 総量 _____ mL
パクリタキセル _____ mL
100mg/16.7mL V
30mg/5mL V

2018.6 最成病院化学療法

最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)					
入院中(階)					
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

	Day	1	8	15	22	28
パクリタキセル		↓	↓	↓		
アバスチン		↓		↓		

化学療法指示書 (ポート・末梢)

TC(乳癌)

週1回1週投与、2週休み(4コース)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

ケモセーフロック輸液セット使用

備考欄

1本目にハックスパイク
つける

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

① 総量 100 mL

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

② 総量 51 mL

③ ドセタキセル(75mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

③ 総量 _____ mL
ドセタキセル _____ mL
80mg/4mL V
20mg/1mL V

④ エンドキサン(600mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

④ 総量 _____ mL
500mg/V V 25mL→ mL

→終了時 生食シリンジ10mL _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

入院時のみ記入

翌日 ジーラスタ皮下注3.6mg 1筒

_____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

化学療法指示書 (ポート・末梢)

トラスツズマブ+TC(乳癌)

週1回1週投与、2週休み(4コース)(初回)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠
★ ロキソプロフェンNa(60) 1錠

直前
直前

1本目にボックスハイク
つける

① プロイメンド1V+生食100mL (30分)
mL/h 時 分 印 印

備考欄
① 総量 100 mL

② { グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A
アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A } (15分)
mL/h 時 分 印 印

② 総量 51 mL

③ トラスツズマブ(8mg/kg) _____ mg
生食250mL (90分) mL/h 時 分 印 印
大塚蒸留水20mL ____ A

③ 総量 mL
150mg/7.2mL V
7.2mL→ mL
60mg/3mL V
3mL→ mL

④ 生食50mL 300 mL/h 時 分 印 印

⑤ ドセタキセル(75mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h 時 分 印 印

⑤ 総量 mL
ドセタキセル mL
80mg/4mL V
20mg/1mL V

⑥ エンドキサン(600mg/m²) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h 時 分 印 印

⑥ 総量 mL
500mg/V V 25mL→ mL

→終了時 生食シリンジ10mL 時 分 印 印

翌日 ジーラスタ皮下注3.6mg 1筒

入院時のみ記入

時 分 印 印

2020.1 最成病院化学療法

西暦 年

コース	1
月/日()	/ ()
時間	:
当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)
医師	
看護師	/
会計	
薬局	
調剤	
調製	

ケモセーフロック輸液セット使用

化学療法指示書 (ポート・末梢)

トラスツズマブ+TC(乳癌)

週1回1週投与、2週休み(4コース)(2回目以降)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前
 ★ ロキソプロフェンNa(60) 1錠 直前

ケモセーフロック輸液セット使用

備考欄

1本目にハックスパイク
つける

- | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|-----|-------------|---------|----|
| ① | プロイメンド1V+生食100mL (30分) | mL/h | 時 分 | 印 印 | ① 総量 | 100 | mL |
| ② | { <u>グラニセトロン3mg/バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A</u>
<u>アロキシ点滴静注バッグ1袋+オルガドロン3.8mg 1A</u> } (15分) | mL/h | 時 分 | 印 印 | ② 総量 | 51 | mL |
| ③ | トラスツズマブ(6mg/kg) _____ mg
生食250mL (60分)
大塚蒸留水20mL _____ A | mL/h | 時 分 | 印 印 | ③ 総量 | | mL |
| | | | | | 150mg/7.2mL | | V |
| | | | | | 7.2mL→ | | mL |
| ④ | 生食50mL 300 mL/h | | 時 分 | 印 印 | 60mg/3mL | | V |
| | | | | | 3mL→ | | mL |
| ⑤ | ドセタキセル(75mg/m ²) _____ mg
生食250mL (60分) | mL/h | 時 分 | 印 印 | ⑤ 総量 | | mL |
| | | | | | ドセタキセル | | mL |
| | | | | | 80mg/4mL | | V |
| | | | | | 20mg/1mL | | V |
| ⑥ | エンドキサン(600mg/m ²) _____ mg
生食250mL (60分) | mL/h | 時 分 | 印 印 | ⑥ 総量 | | mL |
| | | | | | 500mg/V | V 25mL→ | mL |
| | →終了時 生食シリンジ10mL | | 時 分 | 印 印 | | | |

翌日 ジーラスタ皮下注3.6mg 1筒

化学療法指示書 (ポート・末梢)

アブラキサン (乳癌・胃癌)

週1回1週投与、2週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

備考欄

① アブラキサン(220mg/m²) _____ mg
生食100mL (30分) _____ mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
* インラインフィルターは使用しない

① 総量 _____ mL
100mg/V _____ V
20mL→ _____ mL

→終了時 生食50mL _____ 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

1Vあたり生食20mLで溶解
ボトルに残った生食は全て抜き取り、空のボトルに懸濁液を注入する

特定生物由来製剤

* 血液製剤使用表必要
医薬品名、ロット番号記載

化学療法指示書 (ポート・末梢)

カドサイラ(トラスツズマブ エムタンシ)(乳癌)

週1回1週投与、2週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ロキソプロフェンNA(60) 1錠 直前

① オルガドロン3.8mg 1A+生食100ml (15分)
mL/h 時 分 印 印

② カドサイラ (3.6mg/kg) _____ mg
生食250mL 初回90分 mL/h
2回目以降60分 mL/h 時 分 印 印

→終了時 生食50mL 300 mL/h 時 分 印 印

備考欄

① 総量 51 mL

② 総量 mL
160mg/8mL V

8mL→ mL

100mg/5mL V

5mL→ mL

化学療法指示書 (ポート・末梢)

トラスツズマブ(3週毎)(乳癌)

週1回1週投与、2週休み(初回)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ロキソプロフェンNa(60) 1錠 直前

① オルガドロン3.8mg 1A+生食100mL (15分)
mL/h 時 分 印 印

② トラスツズマブ(8mg/kg) _____ mg
生食250mL (90分) mL/h 時 分 印 印
大塚蒸留水20mL _____ A

→終了時 生食50mL 300 mL/h 時 分 印 印

備考欄

① 総量 101 mL

② 総量 mL
150mg/7.2mL V
7.2mL→ mL
60mg/3mL V
3mL→ mL

西暦 年

2020.1 最成病院化学療法

コース	1
月/日()	/ ()
時間	:
当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)
医師	
看護師	/
会計	
薬局	
調剤	
調製	

化学療法指示書 (ポート・末梢)

トラスツズマブ(3週毎)(乳癌)

週1回1週投与、2週休み(2回目以降)

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ロキソプロフェンNA(60) 1錠 直前

① オルガドロン3.8mg 1A+生食100mL (15分)
mL/h 時 分 印 印

② トラスツズマブ(6mg/kg) _____ mg
生食250mL (60分) mL/h 時 分 印 印
大塚蒸留水20mL _____ A

→終了時 生食50mL 300 mL/h 時 分 印 印

備考欄

① 総量 101 mL

② 総量 mL
150mg/7.2mL V
7.2mL→ mL
60mg/3mL V
3mL→ mL

化学療法指示書 (ポート・末梢)

ハラヴェン(乳癌)

週1回2週投与、1週休み

患者名 _____ 診断名 _____

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

月 日 ()

内服 ★ ポララミン(2) 2錠 直前

① グラニセトロン3mgバッグ1袋 (15分)
mL/h 時 分 ⑩ ⑩

② ハラヴェン(1.4mg/m²) _____mg
生食50mL 500 mL/h 時 分 ⑩ ⑩
(0.02mg/ml未満の濃度にならないこと)

→ 終了時 生食50mL 300 mL/h 時 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 50 mL

② 総量 _____ mL
ハラヴェン _____ mL
1mg/2mL V

化学療法指示書A (ポート・末梢)

ハラヴェン+トラスツズマブ(乳癌)(2回目以降)

A→B→1週休み

臨時

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

- 内服 ★ ポララミン(2) 2錠
 ロキソプロフェン(60) 1錠 直前
- ① オルガドロン3.8mg1A+生食100mg (15分)
 mL/h _____ 時 _____ 分 印 印
- ② グラニセトロン3mgバッグ1袋 (15分)
 mL/h _____ 時 _____ 分 印 印
- ③ ハラヴェン(1.4mg/m²) _____ mg
 生食50mL 500 mL/h _____ 時 _____ 分 印 印
 (0.02mg/ml未満の濃度にならないこと)
- ④ 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 印 印
- ⑤ トラスツズマブ(6mg/kg) _____ mg
 生食250mL (60分) _____ mL/h _____ 時 _____ 分 印 印
- 終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 印 印

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 50 mL

③ 総量 _____ mL
 ハラヴェン _____ mL
 1mg/2mL V

⑤ 総量 _____ mL
 150mg/7.2mL V
 7.2mL→ _____ mL
 60mg/3mL V
 3mL→ _____ mL

2019.11 最成病院化学療法

西暦 _____ 年 _____ 最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

化学療法指示書B (ポート・末梢)

ハラヴェン+トラスツズマブ(乳癌)(2回目以降) A→B→1週休み

臨時

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポラミン(2) 2錠 直前

① グラニセトロン3mgバッグ1袋 (15分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② ハラヴェン(1.4mg/m²) _____ mg _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
生食50mL (0.02mg/ml未満の濃度にならないこと)

→ 終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

① 総量 50 mL

② 総量 _____ mL
ハラヴェン _____ mL
1mg/2mL V

2019.11 最成病院化学療法

最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)					
入院中(階)					
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

	Day	1	8	21
ハラヴェン		↓	↓	
ハーセプチン		↓		

化学療法指示書A (ポート・末梢)

ハラヴェン+トラスツズマブ(乳癌)(2回目以降)

A→B→1週休み

臨時

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

- 内服 ★ ポララミン(2) 2錠
 ロキソプロフェン(60) 1錠 直前
- ① オルガドロン3.8mg1A+生食100mg (15分)
 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- ② グラニセトロン3mgバッグ1袋 (15分)
 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- ③ ハラヴェン(1.4mg/m²) _____ mg
 生食50mL 500 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
 (0.02mg/ml未満の濃度にならないこと)
- ④ 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
- ⑤ トラスツズマブ(6mg/kg) _____ mg
 生食250mL (90分) _____ mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩
 大塚蒸留水20mL A
- 終了時 生食50mL 300 mL/h _____ 時 _____ 分 ⑩ ⑩

備考欄

① 総量 100 mL

② 総量 50 mL

③ 総量 _____ mL
 ハラヴェン _____ mL
 1mg/2mL V

⑤ 総量 _____ mL
 150mg/7.2mL V
 7.2mL→ _____ mL
 60mg/3mL V
 3mL→ _____ mL

2019.11 最成病院化学療法

西暦 _____ 年 _____ 最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

化学療法指示書B (ポート・末梢)

ハラヴェン+トラスツズマブ(乳癌)(2回目以降) A→B→1週休み

臨時

患者名 _____ 診断名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

月 _____ 日 ()

内服 ★ ポラミン(2) 2錠 直前

① グラニセトロン3mgバッグ1袋 (15分) _____ mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

② ハラヴェン(1.4mg/m²) _____ mg
生食50mL _____ 500 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩
(0.02mg/ml未満の濃度にならないこと)

→ 終了時 生食50mL _____ 300 mL/h _____ 時 分 ⑩ ⑩

① 総量 50 mL

② 総量 _____ mL
ハラヴェン _____ mL
1mg/2mL _____ V

2019.1 最成病院化学療法

最終施行日から2カ月有効

コース	-	-	-	-	-
月/日()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
時間	:	:	:	:	:
外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)	外来(外科・内科)
当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)	当日入院(階)
入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)	入院中(階)
医師					
看護師	/	/	/	/	/
会計					
薬局					
調剤					
調製					

	Day	1	8	21
ハラヴェン		↓	↓	
トラスツズマブ		↓		